

অপতৃণনাশকৰ বিষক্রিয়া কি ?

অপতৃণনাশকৰ বিষক্রিয়াৰ ফলত অপৰ্যাণ্ড গজালি ওলোৱা, শিপাৰ ক্ষতি, গা-গছ, পাত আদি বগা পৰি যোৱা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ দেখা দিব পাৰে।

কিয় আৰু ক'ত ?

অনুমোদিত মানতকৈ কম বা বেছিকৈ অপতৃণনাশক ব্যৱহাৰ কৰিলে বিষক্রিয়াৰ লক্ষণসমূহ ফুটি উঠে। উদাহৰণ স্বৰূপে — বসায়নৰ মাত্ৰা, শস্যৰ জীৱন স্তৰৰ তাৰতম্য বা বসায়ন আৰু অংকুৰিত বীজৰ সংস্পৰ্শ আদি বিভিন্ন কাৰণত অপতৃণনাশকৰ বিষক্রিয়া ঘটিব পাৰে। উদ্ভিদসমূহৰ জাত আৰু জীৱন চক্ৰৰ বিভিন্ন স্তৰত অপতৃণনাশকৰ প্ৰতি সঁহাৰি ভিন্ন হোৱা দেখা যায়। সাধাৰণতে, বসায়ন প্ৰয়োগৰ লগে লগে বা কিছুদিনৰ পিছতে বিষক্রিয়া হোৱা দেখা যায়।

কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰি ?

ঃ শস্যৰ বীজৰ বদ অংকুৰণ বা বাঢ়ন প্ৰক্ৰিয়াত বাধা। (পেণ্ডিমিথালিন আৰু বীজৰ সংস্পৰ্শ হ'লে)

ঃ শিপাৰ ক্ষতি। (২,৪-ডি ব ফলত হ'ব পাৰে)

ঃ বগা পৰা ধানৰ ঠোক (ফিন ক্লাপ'পৰ ফলত হ'ব পাৰে)

শস্যৰ বাঢ়ন বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব পৰা বিভিন্ন কাৰণসমূহ এনেধৰণৰ-

পৰ্যাণ্ড চহনকৰা (ডাঙৰ চপৰা থাকি যোৱা) বীজ সিঁচা সময়ত শস্যৰ বীজ অধিক গভীৰতাত সোমাই যোৱা, মাটি বেছিচ্চিলা হৈ থকা, বীজ সিঁচাৰ সময়ত প্ৰচণ্ড বৰষুণ, বোকাৰ চামনি, নিম্নমানৰ বীজ, অসংযতভাৱে বীজ সিঁচা, বীজৰ নিম্ন হাৰ, পানীৰ অভাৱ, বোকা পানীৰ ব্যবহাৰ, পোক-পতংগ যেনে- পৰুৱা, উইপোক, চৰাই, নিগনি আদিৰ উপদ্ৰৱ ইত্যাদি।

যদি উপৰোক্ত কাৰণসমূহ শস্যৰ বাঢ়নত বাধা হৈ থিয় দিয়া নাই, তেন্তে কি ধৰণৰ বসায়ন শস্যৰ কোন স্তৰত প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ঠাৱৰ কৰিব লাগে।

কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

অপতৃণনাশকৰ বিষক্রিয়া সাংঘাতিক অৰ্থনৈতিক সমস্যা নহয়। শস্যৰ পথাৰত মাজে সময়ে ভুল ব্যবস্থাপনাৰ ফলত হ'ব পাৰে। বহুক্ষেত্ৰত কৃষকে নতুন বসায়ন এৰিধ ব্যবহাৰ কৰাৰ অনভিজ্ঞতাৰ ফলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। তথাপিও বসায়নৰ অপব্যৱহাৰে জীৱ আৰু পৰিবেশৰ ওপৰত যাতে বিকল্প প্ৰভাৱ নেপেলায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিব লাগে।

কিদৰে ব্যবস্থাপনা কৰিব পাৰি ?

প্ৰথমতেই পথাৰত উদ্ভৱ হোৱা অপতৃণৰ প্ৰকাৰ আৰু পৰিমাণ ঠাৱৰ কৰিব লাগে।

বজাৰত উপলব্ধ হোৱা অপতৃণনাশকৰ অনুমোদিত হাৰ, প্ৰয়োগৰ সময়, সম্ভাৱিত বিষক্রিয়া আদি ভালদৰে পঢ়ি-শুনি বুজি লৈহে ব্যবহাৰ কৰিব লাগে।