

# অসমৰ ধানৰ জাতসমূহ



www.rkbassam.in

অসমত অৰাইজা চেটাইভা (*Oryza Sativa*) পৰিয়ালৰ, ইণ্ডিকা (*Indica*) প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দেশ, মহাদেশত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰা হয়।

## ইণ্ডিকা (Indica)

অসমত প্ৰধানকৈ ইণ্ডিকা প্ৰজাতিৰ খেতি কৰা হয়। ইণ্ডিকাৰ পাতসমূহ পাতল সেউজীয়া বহলৰ পৰা ঠেক প্ৰহুৰ আৰু ওখৰ পৰা মধ্যমীয়া দৈৰ্ঘ্যৰ। ইণ্ডিকা প্ৰজাতি অধিক পোখাবুক্ত, বীজসমূহৰ আকাৰ দীঘলীয়াৰ পৰা চুটি, মিহি, সমান আৰু গুণ্ডুক্ত।

ধানৰ শ্ৰেণী	খেতি কৰা সময়	শ্ৰীকাল	বিৱৰণ
(ক) আছ	মাৰ্চ/এপ্ৰিল	৮০-১৩০	ভূম্যাদী, সাধাৰণতে ছুটিয়াই কৰা, বিভিন্ন জল প্ৰভাৱত কৰা হয়, (০-২০ ছেণ্টিমিঃ) বৰাক উপত্যকাত এই জাতক ডুমাই, মূৰলি আৰু চেংৰবি হিচাপে ভাগ কৰা হয়।
ডুমাই	মাৰ্চ/এপ্ৰিল	৮০-৯০	ছুটিয়াই কৰা হয়, বঙা বীজবৃত্ত।
মূৰলি	মাৰ্চ/এপ্ৰিল	৯০-১০০	ছুটিয়াই কৰা হয়, বঙা বীজবৃত্ত।
চেংৰবি	মাৰ্চ/এপ্ৰিল	৯০-১০০	ছুটিয়াই কৰা হয়, বঙা বীজবৃত্ত।
আহু সংৰোপিত)	মাৰ্চ/এপ্ৰিল	১০০	সংৰোপন কৰা হয়
(খ) শালি (শীতকালীন)	জুন/জুলাই নবেম্বৰ, ডিচেম্বৰ	১৫০-১৮০	পোহৰ সংবেদনশীল, দীৰ্ঘমাদী, বিভিন্ন জল প্ৰভাৱত সংৰোপন (০-৩০ ছেণ্টিমিঃ) বীজ চৰিত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা হয়। ইয়াৰ কিছুমান উপশ্ৰেণী আছে। যেনে, শালি, লাহি, জহা, বৰা আৰু চকোৰা।
	জুন/জুলাই নবেম্বৰ, ডিচেম্বৰ	১৫০-১৮০	বৰাক উপত্যকাত মোটা ধানৰ চাউলক শাহিল বুলি কোৱা হয়।
লাহি	জুন/জুলাই নবেম্বৰ, ডিচেম্বৰ	১৫০-১৮০	মজলীয়া আকাৰৰ চাউল
জহা	জুন/জুলাই নবেম্বৰ, ডিচেম্বৰ	১৫০-১৮০	সুগন্ধযুক্ত আৰু মিহি চাউল
বৰা	জুন/জুলাই নবেম্বৰ, ডিচেম্বৰ	১৫০-১৮০	আঠাবুক্ত, বৰাক উপত্যকাত ইয়াক বিৰেইন বুলি কোৱা হয়।
চকোৰা	জুন/জুলাই নবেম্বৰ, ডিচেম্বৰ	১৫০-১৮০	কম এমাইলাজযুক্ত (Amylose) কোমল চাউল
আচুৰা	এপ্ৰিল/মে ডিচেম্বৰ/জানুৱাৰী	২৪০-২৭০	মধ্যমীয়া জল প্ৰভাৱত কৰিব পৰা ধান। দ অঞ্চলসমূহত সিঁচ বা সংৰোপনৰ ছাৰা এই খেতি কৰা হয়। ১০০ ছেণ্টিমিঃ প্ৰভাৱত পানী সহ কৰিব পাৰে। এই জাতটো আহুধান সিঁচৰ সময়তে সিঁচা হয় আৰু শালি ধান চপোৱা সময়তে চপোৱা হয়।
বাও	এপ্ৰিল/মে ডিচেম্বৰ/জানুৱাৰী	২৭০-৩০০	দ' পানীত বা উপভাই কৰিব পৰা ধান। সাধাৰণতে সিঁচ এই খেতি কৰা হয়। ই ১০০ ছেণ্টিমিঃ তকৈ অধিক প্ৰভাৱত সহ কৰিব পাৰে। আহু ধান সিঁচৰ সময়তে এই ধান সিঁচা হয়। শালি ধান চপোৱাৰ সময়তে চপোৱা হয়।
(গ) বৰো গ্ৰীষ্মকালীন ধান	নবেম্বৰ-মে/জুন	১৮০-২০০	ই পোহৰ অসংবেদনশীল, প্ৰচুৰ শ্ৰীবৃদ্ধিকালত শীত সহ কৰিব পৰা ক্ষমতা, সংৰোপনৰ ছাৰা কৰা হয়। সাধাৰণতে বিল আৰু জলাশয়ত নূন্যতম বা কৰ্ণবিহীনভাৱে কৰা হয়।
জুমা খেতি	মাৰ্চ/এপ্ৰিল ছেপ্তেম্বৰ/অক্টোবৰ	২১০-২৫০	পোহৰ অসংবেদনশীল। পাহাৰৰ খাপ বিলাকত পোনপটীয়াকৈ বীজ সিঁচ এই খেতি কৰা হয়।

## আধুনিক ধানৰ জাত:

**আন্তঃপ্ৰজনন:** ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই জাতসমূহৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মসমূহৰ আনুৰ্ণিক বিন্যাস মাত্ৰ গছৰ লগত একে ধৰণৰ হয়। প্ৰথমতে কেইবাটাও চক্ৰ স্ৰপাৰাগসংযোগ ঘটাই বা আন্তঃপ্ৰজননৰ দ্বাৰা আনুৰ্ণিক সমতা স্থাপন কৰা দুটা বা অধিক জাতৰ মাজত সংকৰণ ঘটাই পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম সমূহ উদ্ভৱন কৰোৱা হয়। এই প্ৰজন্মসমূহৰ বাচনিৰ দ্বাৰা Pure line উদ্ভৱন কৰা হয়।

**বৰ্ণসংকৰ জাত:** এই জাতসমূহে আধুনিক শস্য জাত সমূহতকৈ অধিক উৎপাদনশীল হয়।

**ট্ৰেন্সজেনিক (Transgenic) ধান:** এই জাতসমূহত জিনতত্ত্ব প্ৰযুক্তিৰ কৌশলৰ দ্বাৰা বহিঃজিন আনি সংস্থাপন কৰা হয়।



Assam Agribusiness and Rural Transformation Project (APART)

The World Bank is the funding agency of APART. Department of Agriculture, Assam is the nodal department for implementation of APART. ARIAS Society is the State level coordinating and monitoring agency for APART. Assam Agricultural University is the leading Agricultural University of the State and implementing agency of APART, imparting research and scientific support. International Rice Research Institute (IRRI) is the rice global leader providing technical and non-holding support in the implementation of APART.