

মুঠাজাতীয় অপত্তি :

- : বিনয় বন (শুঁখকা) একাইল' কু'বা ক'ল'না ৭০-৭৫ ছে মিঃ ওখ, মসৃণ, শুঁখকা একবৰ্ণী ঘাঁহ।
- : বিনয় বন (শুঁখনথকা) : এওকাইল' কু'বা ক্রাঙ্গুগলী - একবৰ্ণী ঘাঁহ, পোগ, বীজ উৎপাদন আৰু পোখা মেলাৰ ক্ষমতা আস্তু বেছি। জীৱন কালৰ আগভাগত (পুলি) ধানৰ কষ্টীয়া সদৃশ দেখা যাব বাবে ধান আৰু বিনয় বন নিকপন কৰিবলৈ সূৰ্য নিৰীক্ষণৰ প্রয়োজন। ২০০ ছে মিঃ পৰ্যন্ত ওখ হয়।
- : বিনয় বন : একাইল'কু'বা - গলাৰবেচেনছ - একবৰ্ণী পোগ ঘাঁহ, ধান সদৃশ, ৫০-১০০ ছে মিঃ ওখ।
- : দিজিটেৰীয়া চেটিজেৰা : হুস্বম্যাদী ঘাঁহ, ২০-৬০ ছে মিঃ
- : ইৰীয়াম বল্গ'চাম : আক্রমণাত্মক, পোগ, শুঁখকা একবৰ্ণী ঘাঁহ। জীৱনকালৰ আগ অবস্থাত ধানৰ পুলি সদৃশ, ৬০-১২০ ছে মিঃ ওখ।
- : দিজিটেৰীয়া চিলিয়াবিচ : হুস্বম্যাদী, বহুবৰ্ণী ঘাঁহ, ব মিটাৰ পৰ্যন্ত ওখ হোৱা দেখা যাব।
- : বৰঙ্গ বন (ইলিওচিন ইন্দিকা) : মসৃণ বা সামান্য শুঁখকা, বহুলকৈ বচা একবৰ্ণী ঘাঁহ, বীজ উৎপাদন ক্ষমতা আস্তু বেছি। এবছুত কেইচিও জীৱনচক্ৰ সম্পূর্ণ কৰিব পাৰে। ৩০-৯০ ছে মিঃ পৰ্যন্ত ওখ হোৱা দেখা যাব।
- লেপট'কু'বা চাইনেন্টিচ** : - ভোবোৰা একবৰ্ণী বা বহুবৰ্ণী ঘাঁহ। শিপা বা কাণুৰ চুকুৰাৰ পৰা গজি উঠে। সেইবাবে মাটি চহ কৰা প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াৰ বৎশ বিস্তাৰ ঘটে।

পাচ্পেলাম দিস্তি কাম : - বহুলকৈ বচা, বহুবৰ্ণী আক্রমণাত্মক ঘাঁহ। ইয়াৰ বৎশবৃক্ষি কাণুৰ জৰিয়তে হয়।

উবিদল (অৰাইজা বৰ্ফি পগন) : ধানৰ সমগ্ৰোত্তীয় বনবীৰা ধান সাধাৰণতে ধান চপোৱাৰ আগে বীজসমূহ মাটিত সবি পাৰে।

মুঠাজাতীয় অপত্তি

মুৰুলাবন (চাই পেৰাছ ই বিৰা)

পোগ, মসৃণ গা-গছ ঘন (পোখাৰ্যুক্ত একবৰ্ণী অপত্তি)। জীৱনচক্ৰ প্রায় এক মাহত সম্পূর্ণ হয়, ২০-৭০ ছে মিঃ ওখ হয়।

শিৱালিনেজীয়া (কিঞ্চীষ্টাই লিচ মিলিরেচিয়া)

পোগ, ভোবোৰা, একবৰ্ণী মুঠাবন। বীজ উৎপাদন ক্ষমতা আস্তু বেছি, বীজসমূহ বছুজুৰি অংকুৰিত হোৱা দেখা যাব, ই প্রায় ২০-৭০ ছে মিঃ ওখ হয়।

কেঁৰীৰ চাই পেৰাছ বতুন্ধাচ

পোগ, ১৫-২০ ছে মিঃ ওখ, মাটিৰ তলত কাণুৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে বৎশ বিস্তাৰ কৰে। পথাৰৰ পৰা নিৰ্মল কৰা আস্তু কঢ়ি। নাঞ্জলৰ বালে মাটিৰ তলত কাণুৰসমূহ কঢ়াৰ বলত বতুল বৎশ বিস্তাৰ ঘটে।

চাই পেৰাছ দিক্ৰমিচ

মসৃণ, ২০-৬০ ছে মিঃ ওখ, ভোবোৰা একবৰ্ণী মুঠাজাতীয় বন। বীজ উৎপাদন ক্ষমতা আধিক।

বহুল পতীয়া অপত্তি

ভাতমোটেকা (মন'ক বীৰা ভেজিনেলীছ)

৪০-৫০ ছে মিঃ ওখ, একবৰ্ণী আংশিকভাৱে জলচৰ অপত্তি। বীজ বছুজুৰি অংকুৰিত হয়। উচ্চ নাইট্ৰোজেনযুক্ত মাটিত আক্রমণাত্মক হোৱা দেখা যাব।

কলামৌ (আইপি মীৰা একুৰাটিকা)

মসৃণ, ব্যাপক, বহুবৰ্ণী অপত্তি, ইয়াৰ বাচন খয়তা আস্তু বেছি, কাণুৰ গাঠিত শিপা ওলায়, ১৫-৫০ ছে মিঃ ওখ হয়।

কণাই শিমলু (ক'মেলিনা বেংগালুনেচিচ)

মাটিত বগাই ঘোৱা এৰিধ বসাল অপত্তি। ঠাল-ঠেঁড়ুলীসমূহ ঠিয়।

বনজলকীয়া (লাতৰিজিয়া এদচেণুন্চ)

মসৃণ, বসাল, পানীৰ ওপৰত ওপন্তি বগাই ঘোৱা অপত্তি।

ভংগৰাজ (ই ক্লিঞ্চা প্ৰস্ট্ৰাচি)

প্রায় ৯০ ছে মিঃ ওখ একবৰ্ণী বা কোনো কোনো ফেজাত বহুবৰ্ণীভাৱে হোৱা এৰিধ অপত্তি। বীজৰ দ্বাৰা ইয়াৰ বৎশবিস্তাৰ হয় আৰু বীজ সমূহ বছুজুৰি অংকুৰিত হোৱা দেখা যাব।

স্পীন'ক্রি বা জিলানিকা

পোগ মসৃণ গা-গছ, ৩০-১৫০ ছে মিঃ ওখ একবৰ্ণী বহুলপতীয়া অপত্তি। ই বছুজুৰি শুলে আৰু বীজ উৎপাদন কৰিব পাৰে।

