

ঝীহজাতীয় অপত্তি :

- : বিনয় বন (শুধু থকা) একইন্দি' কু'বা কল'না ৭০-৭৫ ছে মিঃ ওখ, মসুণ, শুধু থকা একবৰ্ণী হাই।
- : বিনয় বন (শুধু নথকা) : এওকইন্দি' কু'বা ক্রান্তগুলী - একবৰ্ণী হাই, পোগ, বীজ উৎপাদন আৰু পোখা মেলাৰ ক্ষমতা আজন্ত বেছি। জীৱন কালৰ আগভাগত (পুলি) ধানৰ কষ্টীয়া সদৃশ দেখা যাব বাবে ধান আৰু বিনয় বন নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সুব্র নিৰীক্ষণৰ প্রয়োজন। ২০০ ছে মিঃ পৰ্যন্ত ওখ হয়।
- : বিনয় বন : একইন্দি' কু'বা - গলাৰবেচেনছ - একবৰ্ণী পোগ হাই, ধান সদৃশ, ৫০-১০০ ছে মিঃ ওখ।
- : দিজিটেৰীয়া চেটিজেৰা : স্বৰ্ম্মানী হাই, ২০-৬০ ছে মিঃ
- : ইঞ্জীৱাম বগ'চাম : আক্রমণাত্মক, পোগ, শুধু থকা একবৰ্ণী হাই। জীৱনকালৰ আগ অবস্থাত ধানৰ পুলি সদৃশ, ৬০-১২০ ছে মিঃ ওখ।
- : দিজিটেৰীয়া চিলিয়ারিচ : স্বৰ্ম্মানী, বহুবৰ্ণী হাই, ল মিটাৰ পৰ্যন্ত ওখ হোৱা দেখা যাব।
- : বৰদুৰ বন (ইলিওচিন ইন্ডিকা) : মসুণ বা সামান্য শুধু থকা, বহুলকৈ বচা একবৰ্ণী হাই, বীজ উৎপাদন ক্ষমতা আজন্ত বেছি। এবছৰত কেইবটাও জীৱনচক্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। ৩০-৯০ ছে মিঃ পৰ্যন্ত ওখ হোৱা দেখা যাব।

লেপ্ট' কু'বা চাইনেন্টিচ :- ভোৰোৱা একবৰ্ণী বা বহুবৰ্ণী হাই। শিপা বা কাণুৰ টুকুৰাৰ পৰা গাজি উঠে। সেইবাবে মাটি চহ কৰা প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াৰ বৎশ বিস্তাৰ ঘটে।

পাচ্পেলাম দিস্তি কাম :- বহুলকৈ বচা, বহুবৰ্ণী আক্রমণাত্মক হাই। ইয়াৰ বৎশবৃক্ষি কাণুৰ জৰিয়তে হয়।

উবিদল (অৰাইজা কফি পগন) : ধানৰ সমগ্ৰীয়া বনীয়াৰা ধান সাধাৰণতে ধান চপোৰাৰ আগে আগে বীজসমূহ মাটিত সৰি পাৰে।

মুঠোজাতীয় অপত্তি

মুবৰুলাবন (চাইপেৰাচ ইবিয়া)

পোগ, মসুণ গা-গছ মন পোখাৰ্যন্ত একবৰ্ণী অপত্তি। জীৱনচক্ৰ থায় এক মাহত সম্পূৰ্ণ হয়, ২০-৭০ ছে মিঃ ওখ হয়।

শিয়ালনেজীয়া (কিস্তিষ্ঠাইলি মিলিয়েচিয়া)

পোগ, ভোৰোৱা, একবৰ্ণী মুঠোবন। বীজ উৎপাদন ক্ষমতা আজন্ত বেছি, বীজসমূহ বছৰজুৰি অংকুৰিত হোৱা দেখা যাব, ই প্রাৰ ২০-৭০ ছে মিঃ ওখ হয়।

কেৰীৰন (চাইপেৰাচ বৰুৰাচ)

পোগ, ১৫-২০ ছে মিঃ ওখ, ভোৰোৱা একবৰ্ণী মুঠোজাতীয় বন। বীজ উৎপাদন ক্ষমতা আজন্ত কঠিন। নাঞ্জলৰ বালে মাটিৰ তলাৰ কাণুৰসমূহ কটাৰ বলত বহুল বৎশ বিস্তাৰ ঘটে।

চাইপেৰাচ দিক্ৰিয়িচ

মসুণ, ২০-৬০ ছে মিঃ ওখ, ভোৰোৱা একবৰ্ণী মুঠোজাতীয় বন। বীজ উৎপাদন ক্ষমতা আধিক।

বহুল পতীয়া অপত্তি

ভাতমোটকা (ম'নক বীয়া ভেজিনেজীছ)

৪০-৫০ ছে মিঃ ওখ, একবৰ্ণী আংশিকভাৱে জলচৰ অপত্তি। বীজ বছৰজুৰি অংকুৰিত হয়। উচ্চ নাইট্রেজেনযুক্ত মাটিত আক্রমণাত্মক হোৱা দেখা যাব।

কলমৌ (আইপি মিয়া একুৰাচিকা)

মসুণ, ব্যাপক, বহুবৰ্ণী অপত্তি, ইয়াৰ বাচন খয়তা আজন্ত বেছি, কাণুৰ গাঠিত শিপা ওলায়, ১৫-৫০ ছে মিঃ ওখ হয়।

কগাই শিয়ালু (ক'মেলিনা বেংগালালেচি)

মাটিত বগাই মোৰা এবিধ বসাল অপত্তি। ঠাল-ঠেঙুলীসমূহ ঠিয়া।

বনজলকীয়া (লাডোবিজিয়া এদচেণেন্চ)

মসুণ, বসাল, পানীৰ ওপৰত ওপৰতি বগাই মোৰা অপত্তি।

ভংগৰাজ (ইকু'আ প্রস্ট্রাটা)

প্রাৰ ৯০ ছে মিঃ ওখ একবৰ্ণী বা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বহুবৰ্ণীভাৱে হোৱা এবিধ অপত্তি। বীজৰ দ্বাৰা ইয়াৰ বৎশবিস্তাৰ হয় আৰু বীজ সমূহ বছৰজুৰি অংকুৰিত হোৱা দেখা যাব।

শ্বীনকু'য়া জিলানিকা

পোগ মসুণ গা-গছ, ৩০-১৫০ ছে মিঃ ওখ একবৰ্ণী বহুলপতীয়া অপত্তি। ই বছৰজুৰি বুলে আৰু বীজ উৎপাদন কৰিব পাৰে।