

পথাৰত বীজ বেছি দ কৈ সিঁচিলে শস্যৰ বৃদ্ধি বাধাগ্ৰস্থ হয়, গজালি মেলি ওলাই আহোঁতে অধিক সময় লাগে, দুৰ্বল হয় আৰু শস্যডবা সুখম নহয়। তেনেস্থলত শস্যতকৈ অপতৃণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি থাকে।

কিয় আৰু ক'ত হয় ?

সাধাৰণতে এই সমস্যা সেমেকা বা পোনপটীয়াকৈ মূল পথাৰত সিঁচা ধানৰ পথাৰত দেখা যায়।

কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি ?

- পুলিবোৰ দুৰ্বল হলে ।
- পাতলকৈ গজিলে ।

সিঁচা পদ্ধতিৰ ওপৰত এই সমস্যা বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। যন্ত্ৰচালিত বীজ সিঁচা সজুলি ব্যৱহাৰ কৰিলে এই সমস্যা শাৰী সমূহত কেতিয়াবা হব পাৰে। অলপ যত্ন ললে এনে সমস্যা নিৰাময় কৰিব পাৰি। প্ৰণালীবদ্ধ ভাবে শাৰী শাৰীকৈ সিঁচাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কোনোবা নিৰ্দিষ্ট এটুকুৰা মাটি অধিক কোমল হৈ থাকিলে তাত এই সমস্যাটো হব পাৰে।

এই সমস্যা সমূহ নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে বীজ সিঁচাৰ গভীৰতাৰ বিষয়ে খেতিয়কজনক পৰামৰ্শ দিয়া উচিত।

প্ৰয়োজনীয়তাঃ-

সঠিক শস্য প্ৰতিষ্ঠাপন অধিক উৎপাদনৰ আধাৰ। সেয়ে বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ গভীৰতা নিৰ্ভৰ কৰে সিঁচা পদ্ধতিৰ ওপৰত।

পৰিচালনাঃ-

বীজসমূহ মাটিৰ উপৰিভাগৰ পৰা ০.৫ ছে.মি গভীৰতাত সিঁচা নিশ্চিত কৰিব লাগে। শুকান মাটিত পোনপটীয়াকৈ সিঁচা পদ্ধতিত মাটিৰ চপবাবোৰ ডাঙৰ হোৱা অনুচিত। সেমেকা মাটিত পোনপটীয়াকৈ সিঁচা পদ্ধতিত মাটিৰ উপৰিভাগ বেছি কোমল হৈ থাকিব নালাগে নহলে বীজসমূহ ওপৰতে বৈ যাব পাৰে।

