

কঠীয়াতলীৰ পৰিচয়



মূল পথাবত বোৱাৰ আগতে কঠীয়াতলীত এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে কঠীয়াখনি বখা হয়। বোপগমোগ্য কঠীয়াৰ বয়স জাতোচৰ কৃষিকাল, কৃষকৰ হ্যাতত থকা সমল, জলবায়ু, বোপগ পক্ষতি আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বেছি পোখা মেলিবলৈ হলৈ আৰু উৎপাদন বেছি পাৰটলৈ হলৈ কঠীয়া কমা বয়সীয়া ল'ব লাগে।

কঠীয়াতলীৰ প্ৰকাৰ ১

বোকা কঠীয়াতলী :

- জলসিদ্ধন থকা জলনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা থকা মাটিত প্ৰযোজন।
- বিমান মাটি বৰ তাৰ দহ ভাগৰ এভাগ মাটিত কঠীয়া পাৰিব লাগে।
- বীজৰ পৰিমাণ - প্ৰতি হেক্টেকত ৪০ — ৪৫ কিঃগ্ৰাম (প্ৰতি বিঘাত ৫ কিঃগ্ৰাম)।
- কৃষিকালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ২১-৩০ দিনীয়া কঠীয়া বোৱাৰ বাবে উপযোগী।



তকান কঠীয়াতলী :

- পানী জমা নহ'ব বাবে কঠীয়াতলীখন ওখকৈকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে।
- কঠীয়াতলীখন ১০ মিঃ দীঘল ১২৫জ্ঞে মিঃ বহুল আৰু ১৫ জ্ঞেমিঃ ওখকৈকে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে।
- বিমান মাটি বৰ তাৰ দহ ভাগৰ এভাগ মাটিত কঠীয়া পাৰিব লাগে।
- এক হেক্টেল মাটিৰ বাবে প্ৰযোজন হোৱা বীজৰ পৰিমাণ ৪০-৪৫ কিঃগ্ৰাম(প্ৰতি বিঘাত ৫ কিঃগ্ৰাম)।
- কৃষিকালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ২১-৩০ দিনীয়া কঠীয়া বোৱাৰ বাবে উপযোগী।



দলিলা বা মেট কঠীয়াতলী :

- পানীৰ সুবিধা থকা সমতল ভূমিত কঠীয়াতলীখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে।
- এক হেক্টেল মাটি বোপগ কৰিবলৈ প্রায় ৭০ বগমিটাৰৰ কঠীয়াতলী লাগে বা বোপগ কৰিবলগীয়া মাটিৰ ১ শতাংশ কঠীয়াতলীৰ প্ৰযোজন হয়।
- প্ৰতি হেক্টেল মাটি বোপগৰ বাবে বীজৰ পৰিমাণ উচ্চ উৎপাদনাক্ষম জাতৰ ফ্ৰেজত ৪০-৫০ কিঃগ্ৰাম আৰু বৰ্গসংক্ৰম জাতৰ ফ্ৰেজত ১০-১৫ কিঃগ্ৰাম বীজৰ দৰকাৰ হয়।
- ১৪-২১ দিনৰ কঠীয়া বোপগৰ বাবে উপযোগী।



মাত্ৰিকভাৱে বোপগৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা কঠীয়াতলী :

- মাটিৰ ভেটি এটা প্ৰস্তুত কৰি জালিকটা পলিথিন এখনত(১.৫ মি. x ২০ মি.) বা খাস্তিকৰ থালি [৩০ ছে. মি. x ৬০ ছে. মি.]ৰ ওপৰত প্ৰতি ৪ ভাগ মাটিৰ লগত ১ ভাগ পচনসাৰ মিহলাই ১-২ ছে. মিঃ ওখ এটা তৰপ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে।
- প্ৰতি হেক্টেল মাটি বোপগৰ বাবে প্ৰযোজনীয় কঠীয়াতলীখন ৭৫-৮০ বগমিটাৰ হব লাগে
- প্ৰতি হেক্টেল মাটি বোপগৰ বাবে বীজৰ পৰিমাণ ৫০-৬০ কিঃগ্ৰাম।
- ২-৩ পতীয়া ১৪-২০ ছে.মিঃ ওখ সৰল বা ১৪-১৮ দিনীয়া কঠীয়া বোৱাৰ বাবে উপযোগী।



কঠীয়াতলীৰ লব লগা মন্ত্ৰ :

- কঠীয়াতলীখন জলসিদ্ধন উৎসৰ ওচৰত হোৱা উচিত।
- কঠীয়াতলীখন ভালদৰে হলৈ বাই বৈয়াই অপত্তগ্ৰুহি কৰি বাখিব লাগে।
- উচ্চ উৎপাদনাক্ষম / বৰ্গসংক্ৰম সুবীজ ব্যবহাৰ কৰিব লাগে।
- কঠীয়াতলীত অংকুৰিত বীজ সিঁচি। বীজবোৰ ১০-১২ মিটা তিমাই, অতিবিকৃত পানীভাগ নিগৰাই দ্বাৰা পৰা ঠাইত সিঁচিৰ আগতে গাপ দি থ'ব লাগে।
- প্ৰতি কিঃগ্ৰাম বীজৰ বাবে ২.৫ গ্ৰাম কাৰ্বেনাজিম / কেপটান / মেংক'জেল ঔৰধ মিহলাই শোধন কৰিব ল'ব লাগে।
- কঠীয়া উপবৃক্ত বয়সত বোপগ কৰা উচিত। আতেৰে বলৈ ২০-২৫ দিনীয়া কঠীয়া আৰু বোৰনী মন্ত্ৰে বলৈ ১৫-১৮ দিনীয়া কঠীয়া ব্যবহাৰ বাবে উপবৃক্ত।

