

শস্যৰ মজুতকৰণ



ধানৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ধানৰ মজুতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এই
পদ্ধতি বা প্ৰক্ৰিয়া সমূহ মজুতকৰণৰ কাৰণ আৰু মজুতকৰণৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।
সাধাৰণতে মজুতকৰণ মিলিং নকৰা ধানৰ ফ্ৰেজৰ কৰা হয় কাৰণ ধানৰ ওপৰৰ বাকলিয়ে ইয়াক
বছতো কীট-পতংগৰ পৰা বক্ষা কৰে আৰু শুগুণ আঙুষ্ঠা বাখে। মুগা চাউলৰ মজুত কৰণৰ বাবে
২০ শতাংশতকৈ কম আৰ্দ্ধতা থাকিব লাগে।



প্ৰৱোজনীয়তা : এটা উন্নত মানদণ্ডৰ মজুতকৰণ ব্যবস্থাত কিছুমান সুবিধা থকাটো অতি প্ৰৱোজন। সেইসমূহ হৈছে -

- ধান শুকোৰাৰ পিছত পুনৰবাৰ মজুতকৰণ কৰিবৰ বাবে প্ৰৱোজনীয় আৰ্দ্ধতা বৰ্তাই বখাত সহজ কৰে।
- পোক-পতংগ, এন্দুৰ আৰু চৰাই-চিৰিকতিল পৰা শস্য অনিষ্ট হৈবাত বাধা প্ৰদান কৰে।
- এই ব্যবস্থাটো পৰিচালনা আৰু চলাবলৈ সহজ হয়।

শস্যৰ বাবে নিৰাপদ মজুতকৰণ ব্যবস্থা :

দীৰ্ঘদিনৰ বাবে শস্য ধান মজুতকৰণ কৰিবলৈ তিনিটা অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য বখাটো অতি প্ৰৱোজন :

- শস্যৰ গুটিৰ আৰ্দ্ধতা ১৪ শতাংশ বা তাতকৈ কম আৰু বীজৰ আৰ্দ্ধতা ১২ শতাংশতকৈ কম বাখিব লাগে।
- শস্যক কীট পতংগ, এন্দুৰ আৰু চৰাইৰ পৰা বক্ষা কৰি বাখিব লাগে।
- শস্যক বৰষুণৰ পানীত তিতাৰ পৰা নাইবাৰ বাবুমণ্ডলৰ জলীয় বাঞ্চপৰ পৰা আত্মত বাখিব লাগে।
- বেছিদিনৰ বাবে শস্য সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হ'লৈ কম আৰ্দ্ধতা বৰ্তাই বাখিব লাগিব। বীজ বা শস্যৰ গুটি ১৪ শতাংশতকৈ বেছিজলীয় বাঞ্চপৰ সংস্পৰ্শত আহিলে ভেঁকুৰৰ উন্তৰ হৈৱাৰ সন্তোৱনীয়তা অধিক হয় যাৰ বাবে বাণিজ্যিক মূল্য আৰু ধান অনুভাবিতা সম্পূৰ্ণৰূপে স্থাস পাৰ।

নিৰোক্ত তালিকাৰ যোগেদি নিৰাপদ মজুতকৰণৰ বাবে প্ৰৱোজন হোৰা আৰ্দ্ধতা :-

সময়	নিৰাপদ মজুতকৰণৰ বাবে প্ৰৱোজন হোৰা আৰ্দ্ধতা	উন্তৰ হ'ব পৰা অসুবিধাসমূহ
২-৩ সপ্তাহ	১৪-১৩ শতাংশ	ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণৰ বাবে ধান বৰণহীন হয় আৰু শাস প্ৰাপ্তিৰ হানি হয়।
৮-১২ মাহ	১২-১৩ শতাংশ	পোক পতংগৰ দ্বাৰা অনিষ্ট হয়।
১ বছৰতকৈ বেছি	৯ শতাংশতকৈ কম	নিৰোগী বীজ।

মনত বাখিবলগীয়া যে, মজুতকৰণ অৱস্থাত বীজৰ আৰ্দ্ধতা ১ শতাংশ বৃদ্ধি অথবা মজুতকৰণৰ সময় উৎপন্ন কৰি ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পালে
ওটিটোৰ মজুতকৰণ সময় আধালৈ স্থাস পাৰ অৰ্থাৎ যাক আগতে ১ বছৰ মজুত কৰিব পৰা গৈছিল সেই ওটি ৬ মাহহে মজুত কৰিব
পাৰি।

