



চপৰা মাটিয়ে বীজ চাকি পেলায়। ইয়াৰ ফলত বীজৰ পানীৰ শোষণ সীমাবদ্ধ হোৱাৰ বাবে অংকুৰণত বাধাগ্ৰস্ত হয়।

কিয় আৰু ক'ত ই ঘটে?

পোনপটীয়াকৈ সিঁচা খেতিত মাটি চপৰা এটা প্ৰধান সমস্যা। শুকান অৱস্থাত মাটি হাল বোৱাৰ ফলত চপৰা সৃষ্টি হয়।

কেনেকৈ এনে মাটি চিনাক্ত কৰিব?

পথাৰত তুলন লক্ষণসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিব

- বোপন কালত মাটিৰ চপৰা বীজতকৈ ডাঙৰ হয়।
- শুকানকৈ সিঁচা খেতিত বীজৰ অংকুৰণ বেয়া হয়।

এনেকুৱা সমস্যা সাধাৰণতে সমগ্ৰ পথাৰডোৱাতে দেখা পোৱা যায়।

শস্য বোপনত বিভিন্ন কাৰকে প্ৰভাৱ পেলায়। এনে কেতবোৰ কাৰক হৈছে — লডামুক্ত মাটিত বীজ ৰুহ গভীৰতলৈ সোমাই যোৱা, বীজ সিঁচাৰ সময়ত মাটি অতি কোমল হৈ থকা, কম পৰিমাণৰ বীজ সিঁচা, পানীৰ অভাৱ, সিঁচাৰ সময়ত বোকাময় পানী, বীজ সিঁচা যন্ত্ৰৰ বাটটো এবি যোৱা আৰু বিভিন্ন প্ৰাণী যেনে পৰুৱা, চৰাই আৰু এন্দুৰে শস্যডোৱাৰ পৰা বীজ আঁতৰাই দিয়া।

কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ?

- ভাল বোপন প্ৰণালী উচ্চ উৎপাদনৰ মাপকাঠি।
- শুকান কৈ সিঁচা খেতিত চপৰা মাটিয়ে পথাৰ এডোৱাত শস্যৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে কমাই দিয়ে।
- বাধাগ্ৰস্ত বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস তথা চপৰা ভাঙিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা অধিক হাল বোৱাৰ খৰচে কৃষি অৰ্থনীতিত পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়।

কেনেদৰে সমাধান কৰিব?

- মাটি অধিক শুকান হ'লে মাটিডোৱাত ভাঙি নোৱাৰা ডাঙৰ ডাঙৰ চপৰাৰ সৃষ্টি হয়।
- পোনপটীয়াকৈ সিঁচি কৰা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত মাটিডোৱাত বিমান পানী নহলে 'শস্য মৰহি যায়' সেই অৱস্থাতকৈ অধিক পানী আৰু পথাৰৰ পানী ধাৰণ ক্ষমতাত কৈ কম পৰিমাণৰ পানী থকা অৱস্থাতহে হাল বোৱা উচিত।
- বোকা মাটিৰ তুলনাত বালিচহীয়া মাটিত অধিক পানী থকা অৱস্থাত হাল বাৰ লাগে।
- বোকা মাটিত প্ৰথমবাৰ হাল বোৱাৰ ১-২ দিনৰ ভিতৰতেই দ্বিতীয়বাৰ হাল বাৰ লাগে। বালিচহীয়া মাটিৰ বেলিকা অৱশ্যে ইয়াতকৈ কেইদিনমানৰ পাছতো দ্বিতীয় বাৰ চহাৰ পৰা যায়।
- বৰষুণ বা জলসিঞ্চনে চপৰাবোৰৰ আকাৰ হ্রাস কৰিব পাৰে।